

【膵臓がん化学療法レジメン一覧】

レジメン名	薬剤名	投与量	施行日	1コース	催吐リスク (参考)
FOLFIRINOX	レボホリナート オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル (bolus) フルオロウラシル (46時間持続)	200 mg/m ² 85 mg/m ² 180 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day1	2週間	高
mFOLFIRINOX	レボホリナート オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル (46時間持続)	200 mg/m ² 85 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ²	day1	2週間	高
アブラキサン+GEM	アブラキサン ゲムシタビン	125 mg/m ² 1000 mg/m ²	day1,8,15	4週間	中
オニバイド+5-FU-LV	オニバイド レボホリナート フルオロウラシル (46時間持続)	70 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²	day1	2週間	中
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1,8,15	4週間	軽
GS (進行・再発)	ゲムシタビン S1	1000 mg/m ² 60 mg/m ²	day1,8 day1夕~day15朝	3週間	軽
GS (術前化学療法)	ゲムシタビン S1	1000 mg/m ² 80 mg/m ²	day1,8 day1夕~day15朝	3週間	軽

※催吐リスク：制吐剤適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 参照