

### 【腎細胞がん化学療法レジメン一覧】

| レジメン名               | 薬剤名              | 投与量                    | 施行日                | 1コース | 催吐リスク (参考) |
|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|------|------------|
| キイトルーダ【3週間隔】        | キイトルーダ           | 200 mg/body            | day1               | 3週間  | 小          |
| キイトルーダ【6週間隔】        | キイトルーダ           | 400 mg/body            | day1               | 6週間  | 小          |
| オブジーボ+ヤーボイ          | オブジーボ<br>ヤーボイ    | 240 mg/body<br>1 mg/kg | day1               | 3週間  | 軽          |
| オブジーボ【2週間隔】+カボメテイクス | オブジーボ<br>カボメテイクス | 240 mg/body<br>40 mg/日 | day1<br>day1-14 内服 | 2週間  | 小          |
| オブジーボ【4週間隔】+カボメテイクス | オブジーボ<br>カボメテイクス | 480 mg/body<br>40 mg/日 | day1<br>day1-28 内服 | 4週間  | 小          |
| キイトルーダ+インライタ        | キイトルーダ<br>インライタ  | 200 mg/body<br>10 mg/日 | day1<br>day1-21 内服 | 3週間  | 小          |
| キイトルーダ+レンピマ         | キイトルーダ<br>レンピマ   | 200 mg/body<br>20 mg/日 | day1<br>day1-21 内服 | 3週間  | 小          |
| バベンチオ+インライタ         | バベンチオ<br>インライタ   | 10 mg/kg<br>10 mg/日    | day1<br>day1-14 内服 | 2週間  | 小          |
| オブジーボ【2週間隔】         | オブジーボ            | 240 mg/body            | day1               | 2週間  | 小          |
| オブジーボ【4週間隔】         | オブジーボ            | 480 mg/body            | day1               | 4週間  | 小          |
| トーリセル               | トーリセル            | 25 mg/body             | day1               | 1週間  | 小          |

※催吐リスク：制吐剤適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 参照