

【食道がん化学療法レジメン一覧】

レジメン名	薬剤名	投与量	施行日	1コース	催吐リスク (参考)
DCF	フルオロウラシル	600 mg/m ²	day1-5	3週間	高
	ドセタキセル	60 mg/m ²	day1		
	シスプラチン	60 mg/m ²	day1		
HD-FP	フルオロウラシル	700 mg/m ²	day1-5	4週間	高
	シスプラチン	70 mg/m ²	day1		
HD-FP+RT	フルオロウラシル	700 mg/m ²	day1-4,29-32	8週間	高
	シスプラチン	70 mg/m ²	day1,29		
	放射線治療		5回/週		
LD-FP	フルオロウラシル	500 mg/m ²	day1-5	1週間	(高)
	シスプラチン	6 mg/m ²	day1-5		
LD-FP+RT	フルオロウラシル	200 mg/m ²	day1-5	1週間	(高)
	シスプラチン	7 mg/m ²			
	放射線治療		5回/週		
mFOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル (bolus) フルオロウラシル (46時間持続)	200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day1	2週間	中
weekly-PTX	パクリタキセル	100 mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	49日間	軽
オブジーボ【2週間隔】	オブジーボ	240 mg/body	day1	2週間	小
オブジーボ【4週間隔】	オブジーボ	480 mg/body	day1	4週間	小
tri-DTX	ドセタキセル	70 mg/m ²	day1	3週間	軽

※催吐リスク：制吐剤適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 参照