

【胃癌化学療法レジメン一覧】

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 施行日 | 1コース | 催吐リスク (参考) |
|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------|------------|
| オブジーボ+XELOX | オブジーボ | 360 mg/body | day1 | 3週間 | 中 |
| | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | | | |
| | カベシタピン | 2000 mg/m ² | | | |
| オブジーボ+SOX | オブジーボ | 360 mg/body | day1 | 3週間 | 中 |
| | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | | | |
| | S1 | 80 mg/m ² | | | |
| オブジーボ+FOLFOX | オブジーボ | 240 mg/body | day1 | 2週間 | 中 |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | | | |
| | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | | | |
| | フルオロウラシル (bolus) | 400 mg/m ² | | | |
| | フルオロウラシル (46時間持続) | 2400 mg/m ² | | | |
| S-1+CDDP | シスプラチン | 60 mg/m ² | day8 | 5週間 | 高 |
| | S1 | 80 mg/m ² | day1夕~day15朝 | | |
| XP | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | 3週間 | 高 |
| | カベシタピン | 2000 mg/m ² | day1夕~day15朝 | | |
| SOX | オキサリプラチン | 100 mg/m ² | day1 | 3週間 | 中 |
| | S1 | 80 mg/m ² | day1夕~day15朝 | | |
| XELOX | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | day1 | 3週間 | 中 |
| | カベシタピン | 2000 mg/m ² | day1夕~day15朝 | | |
| Tmab | トラスツズマブ | 8 mg/kg | day1(初回) | 3週間 | 小 |
| Tmab+XELOX | | 6 mg/kg | day1(2回目以降) | | |
| TmabとXELOXの組み合わせ | | | | | |
| mFOLFOX6 | レボホリナート | 200 mg/m ² | day1 | 2週間 | 中 |
| | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | | | |
| | フルオロウラシル (bolus) | 400 mg/m ² | | | |
| | フルオロウラシル (46時間持続) | 2400 mg/m ² | | | |
| サイラムザ+パクリタキセル | サイラムザ | 8 mg/kg | day1,15 | 4週間 | 軽 |
| | パクリタキセル | 80 mg/m ² | day1,8,15 | | |
| weekly-PTX | パクリタキセル | 70 mg/m ² | day1,8,15 | 4週間 | 軽 |
| サイラムザ+アブラキサン | サイラムザ | 8 mg/kg | day1,15 | 4週間 | 軽 |
| | アブラキサン | 100 mg/m ² | day1,8,15 | | |
| tri-weekly-アブラキサン | アブラキサン | 260 mg/m ² | day1 | 3週間 | 軽 |
| weekly-アブラキサン | アブラキサン | 100 mg/m ² | day1,8,15 | 4週間 | 軽 |
| エンハーツ | エンハーツ | 6.4 mg/kg | day1 | 3週間 | 中 |
| サイラムザ | サイラムザ | 8 mg/kg | day1 | 2週間 | 小 |
| オブジーボ【2週間隔】 | オブジーボ | 240 mg/body | day1 | 2週間 | 小 |
| オブジーボ【4週間隔】 | オブジーボ | 480 mg/body | day1 | 4週間 | 小 |
| tri-DTX | ドセタキセル | 60 mg/m ² | day1 | 3週間 | 軽 |
| S1+tri-DTX | ドセタキセル | 40 mg/m ² | day1 | 3週間 | 軽 |
| | S1 | 80 mg/m ² | day1夕~day15朝 | | |
| weekly-CPT-11 | イリノテカン | 100 mg/m ² | day1,8,15,22 | 6週間 | 中 |
| biweekly-CPT-11【2週-3週】 | イリノテカン | 150 mg/m ² | day1,15 | 5週間 | 中 |
| biweekly-CPT-11【2週-2週-3週】 | イリノテカン | 150 mg/m ² | day1,15,29 | 7週間 | 中 |
| S1+CPT-11 | イリノテカン | 80 mg/m ² | day1,15 | 5週間 | 中 |
| | S1 | 80 mg/m ² | day1夕~day22朝 | | |

※催吐リスク：制吐剤適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 参照