

【大腸がん化学療法レジメン一覧】

レジメン名	薬剤名	投与量	施行日	1コース	催吐リスク (参考)
Bmab+UFT-LV	ヘバシズマブ	5 mg/kg	day1,15	4週間	軽
	UFT ホリナート	300 mg/m ² 75 mg/日	day1-21		
Bmab+Capecitabine	ヘバシズマブ	7.5 mg/kg	day1	3週間	軽
	カペシタビン	2000 mg/m ²	day1夕～day15朝		
Cmab+ピラフトビ+メクトビ	アービタックス	500 mg/m ²	day1,15	4週間	小
	ピラフトビ	300mg×1回	day1～28		
	メクトビ	45mg×2回	day1～28		
Cmab	アービタックス	500 mg/m ²	day1	2週間	小
Pmab	ベクティビックス	6 mg/kg	day1	2週間	小
FOLFOXIRI	イリノテカン	165 mg/m ²	day1	2週間	高
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	3200 mg/m ²			
Bmab+FOLFOXIRI	ヘバシズマブ	5 mg/kg	day1	2週間	高
	イリノテカン	165 mg/m ²			
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	3200 mg/m ²			
mFOLFOX6	レボホリナート	200 mg/m ²	day1	2週間	中
	オキサリプラチン	85 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
Bmab+mFOLFOX6	ヘバシズマブ	5 mg/kg	day1	2週間	中
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
Cmab+mFOLFOX6	アービタックス	500 mg/m ²	day1	2週間	中
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
Pmab+mFOLFOX6	ベクティビックス	6 mg/kg	day1	2週間	中
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
FOLFIRI	レボホリナート	200 mg/m ²	day1	2週間	中
	イリノテカン	150 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
Bmab+FOLFIRI	ヘバシズマブ	5 mg/kg	day1	2週間	中
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	イリノテカン	150 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
Cmab+FOLFIRI	アービタックス	500 mg/m ²	day1	2週間	中
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	イリノテカン	150 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
Pmab+FOLFIRI	ベクティビックス	6 mg/kg	day1	2週間	中
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	イリノテカン	150 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
サイラムザ+FOLFIRI	サイラムザ	8 mg/kg	day1	2週間	中
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	イリノテカン	150 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
ザルトラップ+FOLFIRI	ザルトラップ	4 mg/kg	day1	2週間	中
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	イリノテカン	150 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
SOX	オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1	3週間	中
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
Bmab+SOX	ヘバシズマブ	7.5 mg/kg	day1	3週間	中
	オキサリプラチン	130 mg/m ²			
	S1	80 mg/m ²			

【大腸がん化学療法レジメン一覧】

レジメン名	薬剤名	投与量	施行日	1コース	催吐リスク (参考)
Pmab+SOX	ベクティビックス	6 mg/kg	day1	3週間	中
	オキサリプラチン	130 mg/m ²			
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
XELOX	オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1	3週間	中
	カペシタビン	2000 mg/m ²	day1夕～day15朝		
Bmab+XELOX	ペバシズマブ	7.5 mg/kg	day1	3週間	中
	オキサリプラチン	130 mg/m ²			
	カペシタビン	2000 mg/m ²	day1夕～day15朝		
Pmab+XELOX	ベクティビックス	6 mg/kg	day1	3週間	中
	オキサリプラチン	130 mg/m ²			
	カペシタビン	2000 mg/m ²	day1夕～day15朝		
IRIS	イリノテカン	125 mg/m ²	day1,15	4週間	中
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
Bmab+IRIS	ペバシズマブ	5 mg/kg	day1,15	4週間	中
	イリノテカン	100 mg/m ²			
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
Cmab+IRIS	アービタックス	500 mg/m ²	day1,15	4週間	中
	イリノテカン	100 mg/m ²	day1,15		
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
Pmab+IRIS	ベクティビックス	6 mg/kg	day1,15	4週間	中
	イリノテカン	100 mg/m ²			
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
mXELIRI	イリノテカン	200 mg/m ²	day1	3週間	中
	カペシタビン	1600 mg/m ²	day1夕～day15朝		
Bmab+mXELIRI	ペバシズマブ	7.5 mg/kg	day1	3週間	中
	イリノテカン	200 mg/m ²			
	カペシタビン	1600 mg/m ²	day1夕～day15朝		
Pmab+mXELIRI	ベクティビックス	6 mg/kg	day1	3週間	中
	イリノテカン	200 mg/m ²			
	カペシタビン	1600 mg/m ²	day1夕～day15朝		
mLV-FU	レボホリナート	200 mg/m ²	day1	2週間	軽
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
Bmab+mLV-FU	ペバシズマブ	5 mg/kg	day1	2週間	軽
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
Pmab+mLV-FU	ベクティビックス	6 mg/kg	day1	2週間	軽
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
wCPT-11	イリノテカン	100 mg/m ²	day1,8,15,22	6週間	中
	ペバシズマブ	5 mg/kg	day1	2週間	中
	イリノテカン	150 mg/m ²			
UFT-LV+CPT-11	イリノテカン	60 mg/m ²	day1,15	4週間	中
	UFT	300 mg/m ²	day1-21		
	ホリナート	75 mg/日			

※催吐リスク：制吐剤適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 参照