

## 【胆道がん化学療法レジメン一覧】

レジメン名	薬剤名		投与量	施行日	1コース	催吐リスク（参考）
GCS	シスプラチン		25 mg/m <sup>2</sup>	day1	2週間	中
	ゲムシタビン		1000 mg/m <sup>2</sup>	day1		
	S1		80 mg/m <sup>2</sup>	day1夕～day8朝		
GC	シスプラチン		25 mg/m <sup>2</sup>	day1,8	3週間	中
	ゲムシタビン		1000 mg/m <sup>2</sup>	day1,8		
GS	ゲムシタビン		1000 mg/m <sup>2</sup>	day1,8	3週間	軽
	S1		60 mg/m <sup>2</sup>	day1夕～day15朝		
ゲムシタビン	ゲムシタビン		1000 mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週間	軽
イミフィンジ+GC	イミフィンジ	BW> 30kg	1500 mg/body	day1	3週間(導入療法：8コース)	高
		BW≤30kg	20 mg/kg	day1		
	シスプラチン ゲムシタビン		25 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup>	day1,8 day1,8		
イミフィンジ	イミフィンジ	BW> 30kg	1500 mg/body	day1	4週間(維持療法：PDまで)	小
		BW≤30kg	20 mg/kg	day1		

※催吐リスク：制吐剤適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 参照