

【胃がん化学療法レジメン一覧】

レジメン名	薬剤名	投与量	施行日	1コース	催吐リスク (参考)
オブジーボ+XELOX	オブジーボ	360 mg/body	day1	3週間	中
	オキサリプラチン	130 mg/m ²			
	カベシタピン	2000 mg/m ²	day1夕～day15朝		
オブジーボ+SOX	オブジーボ	360 mg/body	day1	3週間	中
	オキサリプラチン	130 mg/m ²			
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
オブジーボ+FOLFOX	オブジーボ	240 mg/body	day1	2週間	中
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
S-1+CDDP	シスプラチン	60 mg/m ²	day8	5週間	高
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
XP	シスプラチン	80 mg/m ²	day1	3週間	高
	カベシタピン	2000 mg/m ²	day1夕～day15朝		
SOX	オキサリプラチン	100 mg/m ²	day1	3週間	中
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
XELOX	オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1	3週間	中
	カベシタピン	2000 mg/m ²	day1夕～day15朝		
Tmab	トラスツズマブ	8 mg/kg	day1(初回)	3週間	小
		6 mg/kg	day1(2回目以降)		
Tmab+XELOX	TmabとXELOXの組み合わせ				
Tmab+SOX	トラスツズマブ	8 mg/kg	day1(初回)	3週間	中
		6 mg/kg	day1(2回目以降)		
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1	2週間	中
	レボホリナート	200 mg/m ²			
	フルオロウラシル (bolus)	400 mg/m ²			
	フルオロウラシル (46時間持続)	2400 mg/m ²			
サイラムザ+パクリタキセル	サイラムザ	8 mg/kg	day1,15	4週間	軽
	パクリタキセル	80 mg/m ²	day1,8,15		
weekly-PTX	パクリタキセル	70 mg/m ²	day1,8,15	4週間	軽
サイラムザ+アブラキサン	サイラムザ	8 mg/kg	day1,15	4週間	軽
	アブラキサン	100 mg/m ²	day1,8,15		
tri-weekly-アブラキサン	アブラキサン	260 mg/m ²	day1	3週間	軽
weekly-アブラキサン	アブラキサン	100 mg/m ²	day1,8,15	4週間	軽
エンハーツ	エンハーツ	6.4 mg/kg	day1	3週間	中
サイラムザ	サイラムザ	8 mg/kg	day1	2週間	小
オブジーボ【2週間隔】	オブジーボ	240 mg/body	day1	2週間	小
オブジーボ【4週間隔】	オブジーボ	480 mg/body	day1	4週間	小
tri-DTX	ドセタキセル	60 mg/m ²	day1	3週間	軽
S1+tri-DTX	ドセタキセル	40 mg/m ²	day1	3週間	軽
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		
weekly-CPT-11	イリノテカン	100 mg/m ²	day1,8,15,22	6週間	中
biweekly-CPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	day1,15	4週間	中
biweekly-CPT-11【2週-3週】	イリノテカン	150 mg/m ²	day1,15	5週間	中
biweekly-CPT-11【2週-2週-3週】	イリノテカン	150 mg/m ²	day1,15,29	7週間	中
S1+CPT-11	イリノテカン	80 mg/m ²	day1,15	5週間	中
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day22朝		
DOS	ドセタキセル	40 mg/m ²	day1	3週間	中
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	day1		
	S1	80 mg/m ²	day1夕～day15朝		

※催吐リスク：制吐剤適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 参照