

### 【白血病化学療法レジメン一覧】

レジメン名	薬剤名	投与量	施行日	1コース	催吐リスク (参考)
ビダーザ皮下注	ビダーザ	75 mg/m <sup>2</sup>	day1~7(5)	4週間	中
ビダーザ点滴静注	ビダーザ	75 mg/m <sup>2</sup>	day1~7(5)	4週間	中
オンコピン	オンコピン	1 mg/m <sup>2</sup>	day1	1~4週間	小
トレアキシシ	トレアキシシ	100 mg/m <sup>2</sup>	day1,2	4週間	中
マイロターグ	マイロターグ	9 mg/m <sup>2</sup>	day1	2週間	小
ベスポンサ	ベスポンサ	0.8 mg/m <sup>2</sup>	day1	1コース目 原則3週間 (寛解が得られた場合4週間まで延長可)	中
		0.5 mg/m <sup>2</sup>	day8,15		
		0.8 mg/m <sup>2</sup>	day1	2コース目以降(寛解が得られなかった場合) 4週間	
		0.5 mg/m <sup>2</sup>	day8,15		
		0.5 mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		

※催吐リスク：制吐剤適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 参照