

## 【尿路上皮がん化学療法レジメン一覧】

レジメン名	薬剤名	投与量	施行日	1コース	催吐リスク (参考)
オブジーボ【2週間隔】	オブジーボ	240 mg/body	day1	2週間	小
オブジーボ【4週間隔】	オブジーボ	480 mg/body	day1	4週間	小
GC	ゲムシタビン シスプラチン	1000 mg/m <sup>2</sup> 70 mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15 day2	4週間	高
GEM+CBDCA	ゲムシタビン カルボプラチン	1000 mg/m <sup>2</sup> AUC5	day1,8,15 day2	4週間	中
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週間	軽
パベンチオ	パベンチオ	10 mg/kg	day1	2週間	小
キイトルーダ【3週間隔】	キイトルーダ	200 mg/body	day1	3週間	小
キイトルーダ【6週間隔】	キイトルーダ	400 mg/body	day1	6週間	小
パドセブ	パドセブ	1.25 mg/kg	day1,8,15	4週間	軽
GP	ゲムシタビン パクリタキセル	1000 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週間	軽
dose-denseM-VAC	メソトレキセート エクザール ドキシソルビシン シスプラチン	30 mg/m <sup>2</sup> 3 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 70 mg/m <sup>2</sup>	day1 day2 day2 day2	2週間	高
M-VAC	メソトレキセート エクザール ドキシソルビシン シスプラチン	30 mg/m <sup>2</sup> 3 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 70 mg/m <sup>2</sup>	day1,15,22 day2,15,22 day2 day2	4週間	高

※催吐リスク：制吐剤適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 参照